

Ove tri vrste imaju klobuke sa točkama. Ali točke lako otpadnu i znaju potpuno ili dijelom nedostajati.



Muhara

Amanita muscaria

Klobuk 10-25 cm. Boja klobuka može varirati od žarko crvene do blijede narančasto crvene boje. Točke su bijele. Stručak ima debeli prsten i donji dio stručka je proširen. Raste u listopadnim i crnogoričnim šumama.



Smeđa muhara

Amanita muscaria var. regalis

Klobuk smeđe do žuto smeđe boje je 10-20 cm i ima bijelo žute točke. Stručak ima vidljiv prsten i donji dio stručka je proširen. Raste u crnogoričnim šumama.



Panterova muhara

Amanita pantherina

Klobuk je 5-12 cm i različitih je nijansa smeđe boje. Točke su bijele, prsten oko stručka zna ponekad nedostajati. Donji dio stručka je proširen. Obično raste u listopadnim šumama i parkovima, ali zna se naći i u crnogoričnim šumama.

Djelovanje i simptomi otrova

Sve ove gljive sadrže otrove koji štete živčanom sistemu. Zna doći do vrtoglavice, zbuđenosti, osjećaja nemira, smanjene svijesti i grčeva. Ponekad i do osjećaja mučnine i povraćanja.

Kako Vi možete naučiti više o gljivama?

- Pokušajte se pridružiti tečaju o gljivama ili gljivarskom izletu. Postoje i obrazovni savezi (pučka učilišta) i udruženja koja organiziraju takve.
- Dobre web stranice: www.svampkonsulent.se
www.svampguiden.com



Brošura je izrađena od Centrale za informacije o otrovima u suradnji s Državnim savezom stručnih savjetnika za gljive.



Fotografije & grafička oprema: Michael Krikorev

Najopasnije otrovne gljive u Švedskoj!



STOP!

- Nemojte brati gljive koje su slične onima u brošuri!
- Berite jedino gljive koje sigurno prepoznajete!
- Nemojte isprobavati! I otrovna gljiva zna biti ukusna!
- Dopustite jedino odraslim znalcima gljiva da ih čiste!
- Nabavite modernu knjigu o gljivama!



Nazovite 112 u slučaju dogođenog trovanja i zatražite non-stop uslugu za informacije o trovanju.

Nazovite 010-456 6700 u manje hitnim situacijama.
www.gic.se



Smrdljiva pupavka

Amanita virosa

Cijela gljiva je bijele boje. Klobuk 5-12 cm. Na stručku je prsten, ponekad može prsten nedostajati. Kada su gljive jako mlade izgledaju kao jaje. Donji dio stručka, koji se često nalazi duboko u mahovini, je proširen, nabreknut. Smrdljiva pupavka raste u crnogoričnim šumama gdje ima mahovine i u bukovim šumama.

Djelovanje i simptomi otrova

Otrov šteti jetri. Znakovi trovanja su vodeni proljevi, osjećaj mučnine i povraćanje koje počinje satima nakon gljivskog obroka. Opasnost ozbiljnog oštećenja jetre je velika. Trovanje može dovesti do smrti.

Zelena pupavka

Amanita phalloides



Klobuk 5-12 cm. Boja klobuka zna dosta varirati, od skoro sasvim bijele boje do zelenih ili sivih i svijetlo smeđih nijansa. Listići su bijeli. Stručak ima tanak prsten, koji ponekad nedostaje. Donji dio stručka je proširen, nabreknut. Zelena pupavka raste u listopadnim i mješovitim šumama (listopadna i crnogorična stabla rastu zajedno) i na livadnim poljima gdje bukve, hrastovi i ljeske rastu.

Djelovanje i simptomi otrova

Sadrži isti otrov kao smrdljiva pupavka. Daje iste simptome i jednako je opasna – vidite gornji tekst!



Šiljasta koprenka!

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

Klobuk 4-8 cm. Cijela gljiva je crveno smeđe do žuto smeđe boje. Klobuk je često stožastog izgleda, ali ne uvijek. Raste u crnogoričnim šumama gdje ima mahovine i u bukovim šumama. Vrlo slična vrsta koja sadrži isti otrov je narančasto smeđa koprenka ((crvenjača) *C. orellanus*). Raste u listopadnim šumama gdje hrastovi, bukve i ljeske rastu.

Djelovanje i simptomi otrova

Otrov šteti bubrezima, koji mogu postati potpuno upropašteni. Znakovi trovanja pojavljuju se tek nakon nekoliko dana. Ovi mogu dati pojačanu žeđ, bol u mišićima, pojačane ili smanjene količine mokraće. Čovjek koji se otrovao može biti primoran dugotrajnom liječenju dijalizom i možda presađivanju bubrega.

Rani hrčak

Gyromitra esculenta



Rani hrčak pripada sasvim drugoj vrsti gljiva. Klobuk je 4-12 cm, smeđe boje, zaobljen i plisiran. Boje stručka znaju varirati, u svijetlo sivim, smeđim ili blago ljubičastim nijansama. Rani hrčak raste u proljeće od aprila sve do cvjetanja breze, često uz šumske puteve, prevrnutih korijena ili u iskrčene šume.

Djelovanje i simptomi otrova

Otrov šteti živčanom sistemu i isto tako može biti štetan krvnim zncima i jetri. Znakovi trovanja su vrtoglavica, diplopija i nerazgovijetan govor. Može doći i do osjećaja mučnine i bolova želuca.