

لهذه الأنواع الثلاثة قبعات عليها بقع. ولكن عدد هذه البقع يمكن أن يتناقص حتى لا يتبقى منها إلا القليل أو لا يتبقى أي بقع على الإطلاق.

عش الغراب الذبابة

Amanita muscaria

يتراوح قطر القبة بين ١٠ و ٢٥ سم، كما يتراوح لونها من الأحمر الزاهي إلى الأحمر الباهت الضارب إلى البرتقالي. أما البقع، فلونها أبيض. ويوجد بالساق حلقة كبيرة والجزء السفلي منها يبدو منتفخاً. ينمو هذا الفطر في الغابات الموسمية والصنوبرية.



عش الغراب الذبابة البنية

Amanita muscaria var. regalis

قطر القبة التي يتراوح لونها بين البني والبني الضارب إلى الصفرة، ما بين ١٠ و ٢٠ سم، كما يوجد بها بقع بيضاء مائلة إلى الصفرة. ويوجد بالساق حلقة بارزة والجزء السفلي منها يبدو منتفخاً. وينمو هذا الفطر في الغابات الصنوبرية.



عش الغراب النمر

Amanita phantherina

يتراوح قطر القبة بين ٥ و ١٢ سم، ويوجد بها ظلال بنية اللون. تتميز البقع باللون الأبيض، ولا تظهر أحياناً حلقة في الساق. والجزء السفلي من الساق يبدو منتفخاً. ينمو هذا الفطر في الحدائق والغابات الموسمية، وأحياناً أيضاً في الغابات الصنوبرية.



الآثار والأعراض الناجمة عن السم

تحتوي جميع هذه الفطريات على سموم تصيب الجهاز العصبي بالخلل. كما يمكن أن تسبب الشعور بالدوار، والتشوش، والتوتر، وانخفاض مستوى الوعي، والتشنجات. كما قد ينجم عنها أحياناً الشعور بالغثيان والقيء.

كيف يمكنك معرفة المزيد عن الفطر؟

• يمكنك الالتحاق بإحدى الدورات أو الرحلات التعليمية التي تتناول الفطر. حيث تحرص المؤسسات التعليمية والجمعيات المعنية بالفطر على عقد دورات ورحلات تعليمية حول هذا الموضوع.

• مواقع إلكترونية مفيدة: www.svampkonsulent.se
www.svampguiden.com

أخطر أنواع الفطر السام في السويد!



احذر!

- لا تختبر فطر يشبه الأنواع الواردة في هذا الكتيب!
- لا تختبر سوى الأنواع التي تعرفها جيداً!
- لا تتذوقها! فحتى الأنواع السامة من الفطر لذيذة المذاق!
- دع مهمة تنظيف الفطر للأشخاص البالغين ممن هم على دراية بكيفية التعامل معه!
- احرص على اقتناء كتاب حديث يتناول أنواع الفطر!

اتصل برقم ١١٢ (خدمة متاحة على مدار ٢٤ ساعة في اليوم)
في حالات التسمم الطارئة واطلب معلومات متعلقة بالتسمم.
اتصل برقم ٠١٠-٤٥٦٦٧٠٠ في الحالات الأقل خطورة.

www.gic.se



الصور والتخطيط: ميكايل كريستوف

Svampkonsulenternas
Riksförbund

قام بجمع هذا الكتيب المركز السويدي لمعلومات السموم بالتعاون مع الجمعية السويدية لمستشاري الفطر.



فطر ويكاب القاتل

(*C. speciosissimus*) *Cortinarius rubellus*

يتراوح قطر القبة بين ٤ و ٨ سم. ويتراوح لون الفطر بالكامل بين البني الضارب إلى الحمرة والبني الضارب إلى الصفرة. القبة مخروطية الشكل، ولكن ليس دائماً. ينمو هذا الفطر في غابات الصنوبر المكسوة بالطحالب وغابات خشب الزان. يُعتبر فطر ويكاب الخادع (سي أوريلانوس) نوعاً مشابهاً لفطر ويكاب القاتل، ويحتوي على نفس السم. ينمو هذا الفطر في الغابات الموسمية التي تحتوي على شجر الزان، والبلوط، والبنقدق.

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يسبب هذا السم تلفاً بالكليتين، وقد يؤدي إلى تدميرهما بالكامل. لا تظهر علامات التسمم إلا بعد مرور عدة أيام على تناول الفطر. ومن أعراضه الشعور بالعطش، ووجع في العضلات، وزيادة كميات البول أو قلة. قد تؤدي الإصابة بالتسمم إلى اللجوء إلى العلاج بالغسيل الكلوي لمدة طويلة، أو حتى أحياناً زرع كلي.



فطر الملوك القاتل

Amanita virosa

هذا الفطر يكسوه اللون الأبيض بالكامل. يتراوح قطر القبة بين ٥ و ١٢ سم. وعادة ما يوجد بالساق حلقة، ولكنها قد تختفي أحياناً. وعندما تكون هذه الفطريات صغيرة تكون شبيهة بالبيض. والجزء السفلي من الساق، الذي عادة ما يكون مغروساً وسط الطحالب، يبدو منتفخاً. ينمو فطر الملوك القاتل في غابات الصنوبر المكسوة بالطحالب وغابات خشب الزان.

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يعمل السم على إتلاف الكبد. ومن أعراضه الإسهال المائي، والشعور بالغثيان، والقيء الذي يبدأ بعد عدة ساعات من تناول الفطر. ويمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالكبد. قد تؤدي حالة التسمم إلى الوفاة.



الفطر الزائف

Gyromitra esculenta

ينتمي الفطر الزائف إلى فصيلة مختلفة تماماً من الفطريات. يتراوح قطر القبة بين ٤ و ١٢ سم، ولونها بني وتشبه في شكلها شكل مخ الإنسان. يختلف لون الساق، وتحتوي على ظلال ذات لون رمادي فاتح، أو بني، أو بنفسجي باهت. ينمو الفطر الزائف في الربيع ابتداءً من شهر أبريل وحتى تورق أشجار القضبان، ويكون ذلك عادةً بمحاذاة طرق الغابات بالقرب من الجذوع المستأصلة أو في الأراضي التي تم قطع الأشجار بها.

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يصيب هذا السم الجهاز العصبي بالخلل، وقد يؤدي أيضاً إلى تلف خلايا الدم والكبد. ومن أعراضه الشعور بالدوار، وازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام. ومن الأعراض الأخرى المحتمل ظهورها الشعور بالغثيان والآلام بالمعدة.



فطر قبة الموت

Amanita phalloides

يتراوح قطر القبة بين ٥ و ١٢ سم. ويختلف لونها اختلافاً كبيراً، حيث يتراوح من الأبيض الكامل تقريباً إلى الأخضر أو الرمادي كما تحتوي على ظلال لونها بني فاتح. أما الخياشيم، فلونها أبيض. ويوجد بالساق أحياناً - وليس دائماً - حلقة رقيقة. والجزء السفلي من الساق يبدو منتفخاً. ينمو فطر قبة الموت في الغابات الموسمية والغابات المختلطة (الأشجار الموسمية والصنوبرية التي تنمو معاً) وفي المروج التي تحتوي على شجر الزان، والبلوط، والبنقدق.

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يحتوي على نفس السم الذي يحتوي عليه فطر الملوك القاتل. يسبب نفس الأعراض وله تأثير قاتل مماثل - انظر أعلاه!

